



ПРИМАКАИН

современный артикаиновый анестетик из Франции



ВЫСОКАЯ эффективность
+ НИЗКАЯ ТОКСИЧНОСТЬ



ПРИМАКАИН

современный артикаиновый анестетик из Франции

Производитель анестетика ПРИМАКАИН
Актеон Пьер Ролланд Групп




Международная компания Acteon, основанная в начале 80-х годов прошлого века, мировой лидер по производству стоматологического оборудования и расходных материалов. Головной офис находится во Франции. Около 650 человек работают на 5 производственных площадках находящихся в Бильбао, Марсель, Нарнборн, Тютлинген, Бордо, в 8 дочерних предприятиях, и 5 представительствах.

Acteon делится на три подразделения:

Acteon Equipment Satelec - одно из подразделений Acteon занимающееся производством стоматологического оборудования, мировой лидер по производству пьезоультразвуковых генераторов.

Pierre Rolland – фармацевтическое подразделение Acteon, производящее слепочные материалы, анестетики, материалы для эндодонтии и гигиены.

Sopro – подразделение, занимающееся системами визуализации, лидер в производстве интраоральных камер и разработке цифровых визиографов.



ПРИМАКАИН

современный артикаиновый анестетик из Франции

Выпускается в двух вариантах: с концентрацией адреналина 1:100000 и 1:200000

	ПРИМАКАИН 1 / 100 000	ПРИМАКАИН 1/ 200 000
Концентрация адреналина	1/100 000	1/200 000
Состав в одном картридже 1.7 мл.: артикаин адреналин	60.277 мг артикаина гидрохлорида 0.017 мг адреналина тартрата Вспомогательные вещества	60.277 артикаина гидрохлорида 0.0085 мг адреналина тартрата Вспомогательные вещества
Показания к применению	Местная или регионарная анестезия в одонто - стоматологической практике. Препарат показан в тех случаях, когда необходимо добиться обратимой ишемии тканей.	Местная или регионарная анестезия в одонто - стоматологической практике.
Лекарственная форма	Раствор для инъекций	
Форма выпуска	Картридж 1.7 мл (стекло) с пробкой (бромобутил). 50 карпул в упаковке	
Способ применения	Инъекция в подслизистый слой. <i>!!!Удостоверьтесь в отсутствии попадания иглы в сосуд, особенно проводниковой анестезии (блокада нерва). Скорость введения раствора не должна превышать 1 мл в минуту.</i>	



ПРИМАКАИН

современный артикаиновый анестетик из Франции

Выпускается в двух вариантах: с концентрацией адреналина 1:100000 и 1:200000

	Примакаин 1 / 100 000	Примакаин 1 / 200 000
Действующее вещество	Артикаин	
Вазоконстриктор	Адреналин в минимальной дозе	
Стабилизаторы	Низкий уровень сульфитов значительно уменьшает риск возникновения аллергических реакций	
Характеристики	Отсутствие EDTA и парабенов снижает угрозу появления аллергии	
Время наступления анестезии	3 минуты	
Продолжительность анестезии	75 минут	60 минут
Период полураспада	Короткий	
Трансплацентарное проникновение	Низкое	
Тканевая переносимость	Хорошая	
Применение	Используется как для взрослых, так и для детей старше 4 лет, возможно применение препарата больным с сердечнососудистыми заболеваниями, а также беременным женщинам.	
Заживление послеоперационной раны	Не оказывает неблагоприятного действия	



ПРИМАКАИН

современный артикаиновый анестетик из Франции


Большой клинический опыт применения Примакаина доказывает: препарат имеет высокие показатели эффективности и безопасности. По сравнению с другими анестетиками, препарат обладает низкой токсичностью, благодаря отсутствию солей EDTA и парабенов и низкому содержанию сульфитов.

**EDTA
НЕТ**

**ПАРАБЕНОВ
НЕТ**


**СУЛЬФИТОВ
МИНИМУМ**

Артикаин менее токсичен, что обусловлено его низкой жирорастворимостью по сравнению с Лидокаином или Мепивакаином и высокой степенью связывания с белками плазмы крови. Кроме того, если при сложных стоматологических манипуляциях возникает необходимость многократного использования препарата, то можно не опасаться риска аккумуляции Артикаина в организме (период полувыведения Артикаин составляет 20 минут, а Лидокаина 45 минут). Максимальная рекомендуемая доза для взрослых составляет 7 мг/кг. Учитывая, что один картридж содержит 68 мг, то запас безопасности достаточно широк.



ПРИМАКАИН

современный артикаиновый анестетик из Франции



Артикаин, как и другие анестетики, реализует свое действие путем связывания с определенными рецепторами. Способность вступать во взаимодействие со специфическими рецепторами напрямую зависит от степени связывания с белками плазмы крови. За счет высокой степени связывания с белками плазмы крови Артикаин оказывает сильное и продолжительное анальгезирующее действие. Артикаин почти в 1.5 раза сильнее лидокаина.

ПРИМАКАИН обеспечивает глубокую и продолжительную анестезию, быстро блокируя периферические нервные окончания.

ПРИМАКАИН: удобство проведения анестезии с минимальным количеством раствора Примакаина и получением отличных результатов.

Продолжительность анестезии до 75 минут!



ПРИМАКАИН

современный артикаиновый анестетик из Франции

Упаковка анестетика Примакаин.

50 карпул
по 1,7 мл
упакованы в блистеры по 10 шт




X 5 =



Внутренняя блистерная упаковка анестетика Примакаин не только создает дополнительную защиту для карпулы при транспортировке и хранении, но и обеспечивает сохранность остальных карпул, при извлечении карпулы в процессе работы.

Упаковка Примакаина состоит из 5 блистеров по 10 карпул, в случае закупки анестетика клиникой, упаковку легко можно распределить по кабинетам, не нарушая стерильности и не оставляя карпулы незащищенными от механического повреждения при хранении.



ПРИМАКАИН

современный артикаиновый анестетик из Франции

Официальный эксклюзивный дистрибьютор
анестетика ПРИМАКАИН
в России



Где можно купить анестетик Примакаин:

г. Волгоград
ООО "ОЛТА"
(8442)75-15-63, 71-83-15

г. Самара
ООО фирма "Инверсия"
Т. (846)-37-38-000

г. Санкт-Петербург
ООО „Центр Корал“
8-(812)-327-21-77, 712-43-04
www.coralspb.ru

г. Москва
ООО "Эль-Дент"
Т. (495)-789-6739
www.el-dent.ru

г. Барнаул
ООО „Сибирская Стоматологическая Компания“
(8-385-2)200-781, 200-782, 200-783
www.sibstomcom.ru

